


EPILEPSIA Y COVID-19

Recomendaciones para pacientes

El virus SARS-CoV-2 descubierto recientemente en Wuhan (China) es el causante de la enfermedad infecciosa conocida como COVID-19 o enfermedad por coronavirus.



LOS PACIENTES CON EPILEPSIA NO TIENEN MAYOR RIESGO DE INFECCIÓN POR COVID-19

DURANTE EL ESTADO DE ALARMA:




No acuda a consulta o al hospital sin cita: puede ponerse en riesgo usted y poner en riesgo a otras personas. Contacte primero con su neurólogo.



El tratamiento con antiepilépticos es seguro y debe mantenerse.



Tenga una benzodiazepina de rescate en casa para prevenir la asistencia a Urgencias.



Contacte con Emergencias en estas situaciones:

- 1 Crisis convulsiva mayor a 5 minutos
- 2 Aparición de una segunda crisis poco después de la primera
- 3 En caso de lesión, o en caso de convulsión en el agua o en mujeres embarazadas

EN CASO DE INFECCIÓN POR COVID-19

Si está en tratamiento con antivirales/antimicrobianos, puede haber interacciones con algunos antiepilépticos: consulte con su neurólogo



LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS PUEDEN AUMENTAR EL RIESGO DE TENER CRISIS EPILEPTICAS.

ASÍ DEBEMOS ACTUAR:



Disminuir y controlar la temperatura



Utilizar medicamentos antitérmicos



Evitar la deshidratación y seguir las tomas de la medicación

Si está participando en un ensayo clínico con un antiepiléptico, los encargados del ensayo velarán por su seguridad:



Se podrán realizar visitas por teléfono o aplazar algunas visitas



Por seguridad, se evitarán los desplazamientos innecesarios




Permanezca atento a su teléfono para poder recibir posibles llamadas informativas

SIGA LAS RECOMENDACIONES SANITARIAS PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN DEL CORONAVIRUS Y NO DEJE DE TOMAR SU MEDICACIÓN.



Bial

Keeping life in mind.



* Debe tenerse en cuenta que muchas normas son susceptibles de cambiar progresivamente según evolucionen los acontecimientos.